

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Sürekli Tıp Eğitimi

TTB-STE Değerlendirme Soruları

“TOTBİD Yeniden Belgelendirme Kuralları” gereğince yanıtları dergimizin bu sayısındaki makaleler içinde yer alan aşağıdaki soruların yanıtlanıp iki ay içinde eksioglu.fatih@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yedi ve üstü doğru yanıtların listesi TOTBİD’e iletilecektir.

Yayın Kurulu

- 1. Kemik yapısının hem niceliksel hem de niteliksel değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi en etkin görüntüleme yöntemidir?**
 - a) Direkt grafi
 - b) Çift enerjili X-ışını absorpsiyometri (DXA)
 - c) Ultrasonografi
 - d) Niceliksel bilgisayarlı tomografi (QCT)
 - e) Niceliksel ve yüksek çözünürlüklü manyetik rezonans görüntüleme
- 2. Aşağıdakilerden hangisi total diz artroplastisi sonrası çömelme aktivitesini etkileyen en önemli kas olma özelliğine sahiptir?**
 - a) İliopsoas kası
 - b) Semitendinosus kası
 - c) Kuadriseps femoris kası
 - d) Semimembrinosus kası
 - e) Gluteus maksimus kası
- 3. Elle yapılan çay tarımı işçilerinde karpal tünel sendromu adlı çalışma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**
 - a) Ekstansör tenosinovitisin karpal tünel sendromu patofizyolojisinde önemli bir yeri vardır
 - b) Elle süt sağma eylemi ile karpal tünel sendromu gelişimi arasında bir ilişki mevcut değildir
 - c) Mesleğe bağlı gelişen karpal tünel sendromu, idiyopatik tipten farklı olarak median sinir içinde belirgin fasiküller tutulumuna neden olur
 - d) Çalışmada olgulara endoskopik karpal tünel cerrahisi uygulanmıştır
 - e) Endokrin sistem hastalığı ve gebeliği olan olgular çalışmadan çıkarılmamıştır
- 4. Radyasyon sinovektomi işleminin bilinen en önemli komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir.**
 - a) Kondrosarkom
 - b) Deoksiribonükleik asit kırıklarının oluşması
 - c) Ciltte radyonekroz gelişimi
 - d) Sinoviyal sarkom
 - e) Derin ven trombozu
- 5. Aşağıdakilerden hangisi tibia cisim kırıklarında kanal içi çivileme ile ilgili olarak yanlıştır ?**
 - a) Diz önu ağrısı hem kilitli hem de kilitlessiz çivilemede görülebilir.
 - b) Rotasyonel instabilite, kilitli çivilemede kilitlessiz çivilemeye nazaran daha sık görülen bir komplikasyondur.
 - c) Kapalı kilitli çivilemede maruz kalınan radyasyon miktarı ve süresi daha fazladır.
 - d) Kilitli çivileme yapılan olgularda dinamizasyon dördüncü aydan önce yapılmamalıdır.
 - e) Proksimal ve distal çivi migrasyonu daha çok kilitlessiz çivilemelerde görülür.
- 6. Total diz artroplastisi sırasında hastaya spinal anestezi uygulanarak hastanın ameliyat süresince uyanık olmasının ameliyat sonrası ağrı ve kaygı üzerine etkileri hangi seçenekte doğru olarak özetlenmiştir?**
 - a) Ameliyat sonrası ağrı anlamlı ölçüde artarken kaygı düzeyinde değişiklik olmaz.
 - b) Ameliyat sonrası kaygı anlamlı ölçüde artarken ağrı düzeyinde değişiklik olmaz.
 - c) Ameliyat sonrası ağrı ve kaygı düzeyleri anlamlı ölçüde artar.
 - d) Ameliyat sonrası ağrı ve kaygı düzeyleri anlamlı ölçüde azalır.
 - e) Ameliyat sonrası ağrı ve kaygı düzeylerinde anlamlı değişiklik olmaz.
- 7. Aşağıdakilerden diskektomi yöntemlerinden hangisinde omurganın stabilitesi en az bozulur?**
 - a) Parsiyel laminektomi
 - b) Total laminektomi
 - c) Açık diskektomi
 - d) Perkütan transforaminal endoskopik diskektomi
 - e) Total laminektomi ve total diskektomi
- 8. Açık kırıkların değerlendirilmesinde aşağıdaki sınıflamalardan hangisi kullanılır?**
 - a) Herring sınıflaması
 - b) Catterall sınıflaması
 - c) Gustilo-Anderson sınıflaması
 - d) Thomas sınıflaması
 - e) Tachdjian sınıflaması
- 9. Hangisi Jaffe-Campanacci sendromunu taklit eden yeni sendrom olarak yayınlanan olgunun özelliklerinden değildir?**
 - a) Basit kemik kisti
 - b) Gelişme geriliği
 - c) Spina bifida
 - d) Multipl nonossifiye fibrom
 - e) Eritem ve kaslarda dökülme
- 10. Bilindiği üzere osteokondromlar nadiren de olsa kondrosarkoma dönüşebilmektedir. Bu durum sekonder kondrosarkom olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bir osteokondromun, kondrosarkoma dönüştüğü konusunda şüphelenmemizi gerektirecek bulgulardan değildir.**
 - a) İskelet büyümesi durduktan sonra osteokondromun büyüme eğilimi
 - b) Röntgende kartilaj şapkada dağınık kalsifikasyonların görülmesi
 - c) Kartilaj şapkanın manyetik rezonans görüntülemesinde 2 cm'den kalın ölçülmesi
 - d) Yumuşak doku kitlesinin gelişmesi
 - e) Sintigrafik tutulum.

11. Ameliyat edilen ayak bileği kırıklarına erken dönemde rehabilitasyon uygulanması aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

- a) Erken enfeksiyon riski
- b) Erken işe dönüş
- c) Venöz tromboemboli engellenmesi
- d) Daha çok osteoartrit riski
- e) Kıkırdak iyileşmesi üzerine olumlu etki

12. Aşağıdaki tümörlerden hangisinde spinal metastaz nadir olarak görülür?

- a) Meme
- b) Akciğer
- c) Prostat
- d) Böbrek
- e) Gastrointestinal kanal