

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Sürekli Tıp Eğitimi

TTB-STE Değerlendirme Soruları

“TOTBİD Yeniden Belgelendirme Kuralları” gereğince yanıtları dergimizin bu sayısındaki makaleler içinde yer alan aşağıdaki soruların yanıtları iki ay içinde eksioglu.fatih@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yedi ve üstü doğru yanıtların listesi TOTBİD’e iletilecektir.

Yayın Kurulu

- 1. Posttravmatik veya dejeneratif ağırlı el bileği lezyonlarının cerrahi tedavisinde geçmişte bir kurtarma ameliyatı olarak görülürken, günümüzde kabul edilebilirliği ve uygulanması artmış, karpal kemiklerin sadeleştirilmesi işlemi olan cerrahi hangisidir?**
 - a) Total el bileği artrodezi
 - b) Limitli el bilek füzyonu
 - c) Açık redüksiyon ve greftleme
 - d) Proksimal sıra karpektomi
 - e) El bileği artroplastisi
- 2. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası ağrı değerlendirme yöntemidir?**
 - a) Modifiye Bromage skalası
 - b) Verbal rating skala
 - c) Glaskow koma skalası
 - d) Aldrete skoru
 - e) Derlenme deşarj skorlama sistemi
- 3. Aşağıdakilerden hangisi parsiyel ön çapraz bağ kopmalarında destekleme tekniği ile onarımın olumlu etkisi değildir?**
 - a) Propriyoseptif kazanım
 - b) İyileşmeye olumlu etki
 - c) Biyomekanik olumlu etki
 - d) Daha kolay cerrahi teknik
 - e) Tünel yerlerinin kolay bulunması
- 4. Elin dorsal kütanöz inervasyonu ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?**
 - a) El dorsalininin radial taraf duyası radial sinirin yüzeyel dalı tarafından alınır.
 - b) El dorsalinin ulnar taraf duyası ulnar sinir duya dalı tarafından alınır.
 - c) Median sinirin el dorsalinin duyasal inervasyonuna katkısı yoktur.
 - d) El bilek artroskopisi sırasında 6R ve 6U portaller açılırken ulnar sinir zedelenebilir.
 - e) El dorsalinde duyasal sinirlerin seyri büyük değişkenlikler gösterir.
- 5. Aşağıdakilerden hangisi diz manyetik rezonans sagittal T2 görüntülerde kova sapı menisküs yırtığı lehine bir bulgudur?**
 - a) Meniskal trunkasyon bulgusu
 - b) Menisküs içinde hiperintensite
 - c) Çift arka çapraz bağ bulgusu
 - d) Çentik içinde serbest cisim görüntüsü
 - e) Çift ön çapraz bağ bulgusu
- 6. Dizde varus oluşumuna hangilerinin katkısı mevcut değildir.**
 - a) Tibia proksimal metafizindeki çökme
 - b) Femoral lateral kondilin normalden uzun olması
 - c) Diz üzerindeki artmış abdüksiyon kuvveti
 - d) Eklem kıkırdak harabiyeti
 - e) Kalça adduktor kaslarının zayıf olması
- 7. Humerus cisim kaynamamalarında altın standart tedavi yöntemi olarak birçok yazar tarafından kabul edilen kompresif plaklamada kaynamama hattı proksimal ve distali için en az kaç korteks tespit önerilmektedir?**
 - a) 4
 - b) 5
 - c) 6
 - d) 7
 - e) 8
- 8. 2011 Van depremi sonrası fasyotomi yapılan hastaların kaçında amputasyon yapıldı?**
 - a) 3
 - b) 5
 - c) 7
 - d) 8
 - e) 11
- 9. Aşağıdakilerden hangisi fondaparinusun yan etkilerinden biri değildir?**
 - a) Yara iyileşmesini geciktirme
 - b) Trombositopeni
 - c) Kanama
 - d) Özellikle ayak ve bacaklarda güçsüzlük
 - e) Enjeksiyon yerinde ras veya ekimoz
- 10. Kist hidatik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.**
 - a) Etken olan parazit *Echinococcus granulosus*'tur.
 - b) Parazitin kesin kanakçısı köpek, tilki, kurt gibi etçil hayvanlardır.
 - c) Manyetik rezonans görüntüleme de watery sign patognomoniktir.
 - d) İzole iskelet kası tutulumu nadirdir.
 - e) Kist hidatik en sık akciğerde yerleşir.
- 11. Osteokondroma en sık hangi kemik metafizinde yerleşim gösterir?**
 - a) Tibia
 - b) Skapula
 - c) Vertebra
 - d) Femur
 - e) Kaburgalar