

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Sürekli Tıp Eğitimi

TTB-STE Değerlendirme Soruları

“TOTBİD Yeniden Belgelendirme Kuralları” gereğince yanıtları dergimizin bu sayısındaki makaleler içinde yer alan aşağıdaki soruların yanıtlanıp iki ay içinde eksioglu.fatih@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yedi ve üstü doğru yanıtların listesi TOTBİD’e iletilecektir.

Yayın Kurulu

- Aşağıdakilerden hangisi Osteoporoz için risk faktörü değildir?**
 - Kadın cinsiyet
 - Düşük kemik mineral yoğunluğu
 - Obezite
 - Sedanter yaşam
 - İleri yaş
- Hangisi Van depreminde en fazla uygulanan cerrahi prosedür oldu?**
 - Debridman
 - Dış fiksasyon
 - Fasyotomi
 - Açık redüksiyon ve internal tespit
 - Kapalı redüksiyon ve internal tespit
- Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında posteriordeki damar yapılarına zarar verme olasılığı hangi aşamada en yüksektir?**
 - Notchplasti
 - Tibial tünel drillmesi
 - Femoral tünel drillmesi
 - Greftin tibiada tespiti
 - Greftin femurda tespiti
- Aşağıdakilerden hangisi biyoelektrik impedans analizinin kullanım avantajları arasında sayılmaz ?**
 - Yatakta uygulanabilir
 - Ucuzdur
 - Kolay taşınabilir
 - Hastaların beslenme durumlarından etkilenmez
 - Non-invazif bir yöntemdir
- Aşağıdaki yöntemlerden hangisi patellar yüksekliği ölçmek için kullanılır?**
 - Brazier yöntemi
 - Ferguson yöntemi
 - Graf yöntemi
 - Caton yöntemi
 - Jig metodu
- Kondroblastom sıklıkla hangi kemiklere yerleşir?**
 - Kafatası, maksilla, omurga.
 - Pelvis ve diğer yassı kemikler.
 - El ve ayak küçük kemikleri.
 - Proksimal humerus, distal femur, proksimal tibia.
 - Patella, metatarslar ve metakarpalar.
- Aşağıdakilerden hangisi donuk omuzu olan bir hastanın rehabilitasyonunda öncelikli hedeflerden biri değildir?**
 - Posterior kapsül kısalığının azaltılması
 - Skapular hareketliliğinin artırılması
 - Aktivite ile oluşan ağrının azaltılması
 - Skapular stabilizasyonun sağlanması
 - Gece ağrısının azaltılması
- Aşağıdakilerden hangisi arı sütünün sahip olduğu farmakolojik etkilerdendir?**
 - Antialerjik etki
 - Antitümör etki
 - Antihiperkolesterolemik etki
 - Antiinflamatuvar etki
 - Hepsi
- Aşağıdakilerden hangisi sıyrılmış bir pedikül vidasının revizyonu sırasında kullanılan tekniklerden bir tanesi değildir?**
 - Kalsiyum-trifosfat ile augmentasyon
 - Küçük vida kullanılması
 - Farklı vida yönü açılması
 - Genişleyebilir vida kullanılması
 - Polimetilmetakrilat augmentasyonu
- Kubital tünel sendromu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**
 - Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir.
 - Hastalar en sık 4. ve 5. parmakta oluşan uyuşmadan yakınır.
 - Üst ekstremitenin en sık görülen tuzak nöropatisidir.
 - Cerrahi tedavide esas olarak ulnar sinirin dekompresyonu amaçlanır.
 - Sinire transpozisyon yapılacaksa ciltaltına, kasın içine veya kasın altına yapılabilir.
- Aşağıdaki ifadelerden hangisi femoroasetabuler sıkışma (FAS) için yanlıştır.**
 - FAS, femur ve asetabulum kaynaklı bir patolojidir ve sıklıkla genç erişkinlerde görülür.
 - En sık femur (cam) tipi FAS görülür.
 - FAS iki taraflı görülebilir.
 - Radyolojik teşhis için kullanılan alfa açısı MRG ve BT kesitleri ile de ölçülebilir.
 - Cerrahi tedavinin başarısı ameliyat esnasında kalça eklemi artrozu ile ilişkilidir.