

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Sürekli Tıp Eğitimi

TTB-STE Değerlendirme Soruları

“TOTBİD Yeniden Belgelendirme Kuralları” gereğince yanıtları dergimizin bu sayısındaki makaleler içinde yer alan aşağıdaki soruların yanıtları iki ay içinde eksioglu.fatih@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yedi ve üstü doğru yanıtların listesi TOTBİD’e iletilecektir.

Yayın Kurulu

- 1. Perthes hastalığının uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki sınıflamalardan hangisi kullanılabilir?**
 - a) Herring sınıflaması
 - b) Catterall sınıflaması
 - c) Stulberg sınıflaması
 - d) Thomas sınıflaması
 - e) Tachdjian sınıflaması
- 2. Kapiteklar osteokondritis dissekans tedavisinde hangi tedavi seçeneği büyüme plağı kapanmamış olgularda büyüme plağı yaralanmasına neden olabilir?**
 - a) Lezyonun drilllenmesi
 - b) Osteokondral otogreftle rekonstrüksiyon
 - c) Otolog kondrosit implantasyonu
 - d) Mozaikplasti
 - e) Lateral kondile kapalı kama osteotomisi
- 3. Aşağıdaki cerrahi yöntemlerden hangisi ayak bileği kronik lateral instabilitesinin cerrahi tedavisinde kullanılan güçlendirilmiş anatomik bir yöntemdir?**
 - a) Chrisman Snook yöntemi
 - b) Colville yöntemi
 - c) Evans yöntemi
 - d) Broström-Gould yöntemi
 - e) Watson-Jones yöntemi
- 4. Titanyum enstrümantasyonun avantajlarından olmayan özellik hangisidir?**
 - a) Koroziv özelliğinin daha az olması
 - b) Alerjik özelliğinin daha az olması
 - c) Fibrojenik özelliğinin daha az olması
 - d) Bilgisayarlı tomografiye uyumlu olması
 - e) Polimorfonükleosit ve bakteriyel glikokaliks oluşumunu inhibe edebilmesi
- 5. Skapula volar yüz osteokondromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**
 - a) Snapping (atlama, takılma) yakınmalarına neden olur.
 - b) Luchka tüberküli ile klinik olarak karışabilir.
 - c) Tedavide önce biyopsi yapmak gerekir.
 - d) Endoskopik eksizyon uygulanabilir.
 - e) Cerrahi eksizyon asıl tedavi olmalıdır.
- 6. Adolesan Blount Hastalığı ile ilgili doğru olmayan hangisidir?**
 - a) Varus deformitesidir
 - b) Proksimal tibial fizis’in lateral yüzünde büyüme duraklaması mevcuttur
 - c) Obez çocuklarda görülme sıklığı daha yüksektir
 - d) Yürüme bozukluklarına yol açabilir
 - e) Genç erişkinlerde prematür osteoartrite yol açabilir
- 7. Benign yumuşak doku tümörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?**
 - a) Lipom en yaygın gözlenen benign yumuşak doku tümörüdür.
 - b) Lipomlar yavaş büyüme eğilimindedirler ve vücutta yağ dokunun bulunduğu herhangi bir bölgeden kaynaklanabilirler.
 - c) Lipom etyolojide künt travma rol alabilir.
 - d) Lipom eksizyon sonrası %20’den fazla rekürens oranı mevcuttur.
 - e) Benign yumuşak doku tümörü olan lipomlarda malignensi dönüşümü son derece nadirdir.
- 8. Artroskopik parsiyel menisektomi uygulanan hastalarda daha düşük ağrı şiddeti, daha yüksek ameliyat memnuniyeti ve daha iyi fonksiyonel durum aşağıdaki şıklardan hangisinde görülmemiştir?**
 - a) Erkek cinsiyet
 - b) Cerrahi sırasında saptanan eklem dejenerasyonunun az olması
 - c) Ameliyat öncesi aktivite düzeyinin yüksek olması
 - d) Ameliyat sonrası geçen sürenin beş yıldan az olması
 - e) Vücut kütle indeksinin yüksek olması
- 9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**
 - a) Siprofloksasin kırık iyileşmesini olumlu etkiler.
 - b) Sefazolin sodyumun kırık iyileşmesine olumsuz etkisi olmadığı saptanmıştır.
 - c) Vitamin D ve E kırık iyileşmesini olumsuz etkiler.
 - d) Serbest oksijen radikalleri kırık iyileşmesini olumlu etkiler.
 - e) Kırık iyileşmesi az sayıda faktörün etkili olduğu, basit bir olaydır.